BB Stockholm

Vändningsförsök

Det är en fördel om barnet kommer med huvudet först eftersom det har större omfång än sätet. Vändningsförsöket görs efter graviditetsvecka 36 och det lyckas i ungefär hälften av alla fall. Komplikationer i samband med vändningsförsöket är ovanligt.

Förberedelser

På morgonen den dag du ska göra vändningsförsöket får du dricka, men inte äta någon fast föda. Detta är en extra säkerhetsåtgärd om någon komplikation skulle tillstöta.

Hur går det till?

När du kommer till mottagningen gör vi först en noggrann kontroll av barnets läge med hjälp av ultraljud. Om barnet fortfarande ligger i säte kopplar vi CTG och förbereder för vändningen.

Du får en infart för dropp i handen och en injektion av Bricanyl, ® ett läkemedel som gör att livmodermuskeln slappnar av. Du får lite hjärtklappning och kan känna dig darrig under en kort stund pga. läkemedlets biverkningar.

Förlossningsläkaren gör sedan ett försök att vända barnet genom att få det att slå en kullerbytta framåt. Det kan kännas lite obehagligt, men gör inte ont. Skulle du uppleva smärta avbryts vändningsförsöket. Under vändningen kontrollerar man barnets läge och hjärtljud med ultraljud med jämna mellanrum.

Efter en lyckad vändning körs en CTG registrering i ca 45 minuter. Därefter får du gå hem och invänta förlossningsstarten. Om vändningen inte lyckas får du ett samtal med förlossningsläkaren för att diskutera hur du ska föda ditt barn. Om det är aktuellt att föda barnet vaginalt görs en bäckenmätning på dig och en viktskattning av barnet.

Hela besöket kan ta flera timmar beroende på om vändningsförsöket lyckas eller inte.

Ta med din legitimation.

Din barnmorska på barnmorskemottagningen bokar tiden.

BB Stockholms Specialistmödravård
Ni hittar oss på Danderyds sjukhus, hus 14 (samma hus som förlossningen) på plan 4.

Telefonnummer: 08-123 570 20